

Zantac[®] REDUGAS[™]

Lycosyl[™] (125mg simethicone + 500mg inuline)



Lees de gebruiksaanwijzing in zijn geheel door voordat u Zantac[®] Redugas[™] gebruikt en bewaar deze daarna zorgvuldig, omdat deze belangrijke informatie bevat. Neem contact op met uw huisarts of apotheek als u meer informatie of advies wilt of wanneer u na innamen van Zantac[®] Redugas[™] een ongewone werking ervaart.

Voor wie is Zantac[®] Redugas[™]?

Veel mensen ervaren van tijd tot tijd een opgeblazen gevoel, voornamelijk als gevolg van ingesloten darmgassen. Een opgeblazen gevoel kan leiden tot hinderlijke symptomen zoals buikkrampen, gasontwikkeling en een vol en beklemmend gevoel. Dit heeft invloed op het dagelijkse leven. Zantac[®] Redugas[™] is ontwikkeld om een oplossing te bieden aan mensen die last hebben van een opgeblazen gevoel.

Wat is Zantac[®] Redugas[™]?

Zantac[®] Redugas[™] zorgt voor snelle verlichting van een opgeblazen gevoel en herstelt de natuurlijke darmflora dankzij Lycosyl[™], een effectieve combinatie van simethicone en inuline.

Wat zit er in Zantac[®] Redugas[™]?

Zantac[®] Redugas[™] bevat Lycosyl[™], dat de effectiviteit van simethicone combineert met de bewezen heilzame werking van prebiotica (inuline). Simethicone vernietigt gasbellen, terwijl prebiotica (inuline) de natuurlijke darmflora herstellen, waardoor nieuwe gasontwikkeling wordt verminderd. De tabletten bevatten ook sorbitol, siliciumdioxide, zetmeel, magnesiumstearaat en pepermuntaroma.

Hoe gebruikt u Zantac[®] Redugas[™]?

Dit product is aanbevolen voor volwassenen (18 jaar en ouder). Neem 1 tablet na de maaltijd of voor het slapen gaan wanneer symptomen zich voordoen. De tabletten dienen goed gekauwd te worden voor het doorslikken. Neem niet meer dan 4 tabletten per dag. Als u een dosis vergeet, is het niet nodig de volgende dosis te verdubbelen, maar ga na de volgende maaltijd gewoon verder met de behandeling. Dit product mag niet langer dan 4 weken achter elkaar gebruikt worden. Als de symptomen na 4 weken gebruik aanhouden of verergeren, neem dan contact op met uw huisarts of apotheek.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik Zantac[®] Redugas[™] niet als u lijdt aan fructose-intolerantie. Gebruik Zantac[®] Redugas[™] niet als u allergisch bent voor één van de ingrediënten. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en voor kinderen onder de 18 jaar: het wordt aanbevolen om voor gebruik contact op te nemen met uw huisarts. Als er een allergisch reactie of ernstige bijwerking optreedt na gebruik van Zantac[®] Redugas[™], neem dan contact op met uw huisarts of apotheek. Als er sprake is van een medische aandoening, neem dan contact op met uw huisarts of apotheek.

Bewaren

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Op een droge plaats en beneden 25°C bewaren. Niet gebruiken na de aangegeven vervaldatum: zie verpakking en doordrukstrip.

Zantac[®] Redugas[™] is een product van Zantac[®]. Zantac[®] biedt producten voor het herstel en behoud van een gezonde spijsvertering.

Brandend maagzuur en zure oprispingen

Zantac[®] Snel kauwtabletten* bieden effectief een snelle werking en bescherming bij brandend maagzuur en zure oprispingen. Zantac[®] Snel werkt in 2 minuten en beschermt tot 4 uur lang.

* Medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Kijk voor meer informatie op www.zantac.nl

Fabrikant:

Dr. Kleine Pharma GmbH, Heidsieker Heide 114,
33739 Bielefeld, Duitsland

Distributeur:

Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612,
3002 AP Rotterdam

Zantac[®] Redugas[™] is een gecertificeerd medisch hulpmiddel waarvan de veiligheid en doeltreffendheid beoordeeld zijn onder de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

Revisiedatum

Februari 2020

351_REV02 / G01

LF13547D  
0481